

**DOLOPLUS SCHAAL-2**

gedragsmatige pijnbeoordeling bij ouderen

NAAM:

Voornaam:

Afdeling:

Datum:

**LICHAMELIJKE REACTIES:**

		Score
1. ● Lichamelijke klachten	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geen klachten</li> <li>● Klachten alleen bij navraag</li> <li>● Spontane klachten die af en toe voorkomen</li> <li>● Spontane klachten die voortdurend aanhouden</li> </ul>	0 1 2 3
2. ● Pijnvermijdende lichaamshouding in rust	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geen pijnvermijdende lichaamshouding</li> <li>● Patiënt vermijdt af en toe bepaalde lichaamshoudingen</li> <li>● Permanente doeltreffende pijnvermijdende lichaamshouding</li> <li>● Permanente niet doeltreffende pijnvermijdende lichaamshouding</li> </ul>	0 1 2 3
3. ● Afscherming van pijnlijke plaatsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geen afscherming</li> <li>● Afscherming bij toenadering, zonder dat voortzetting van het onderzoek of verzorging wordt belemmerd</li> <li>● Afscherming bij toenadering met belemmering van het onderzoek of verzorging</li> <li>● Afscherming in rust, ook wanneer er geen toenadering plaats vindt</li> </ul>	0 1 2 3
4. ● Gelaatsuitdrukking	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normale gelaatsuitdrukking</li> <li>● Pijnlijke gelaatsuitdrukking bij toenadering</li> <li>● Pijnlijke gelaatsuitdrukking ook zonder toenadering</li> <li>● Voortdurend ongebruikelijke uitdrukkingloze gelaatsuitdrukking (stil, verstart, lege blik)</li> </ul>	0 1 2 3
5. ● Slaappatroon	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normaal slaappatroon</li> <li>● Problemen met inslapen</li> <li>● Vaak wakker worden (onrust)</li> <li>● Slapeloosheid met als gevolg slaperigheid overdag</li> </ul>	0 1 2 3

**PSYCHOMOTORISCHE REACTIES:**

6. ● Verzorgen en aankleden	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden</li> <li>● Gebruikelijke mogelijkheden zijn beperkt (verzorgen en/of aankleden is moeilijk maar wel volledig mogelijk)</li> <li>● Gebruikelijke mogelijkheden zijn zeer beperkt, verzorgen en/of aankleden is moeilijk en maar gedeeltelijk mogelijk</li> <li>● Verzorgen en/of aankleden is onmogelijk, de patiënt verzet zich bij elke poging</li> </ul>	0 1 2 3
7. ● Bewegingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden</li> <li>● Gebruikelijke actieve mogelijkheden zijn beperkt (patiënt vermijdt bepaalde bewegingen en vermindert loopafstanden)</li> <li>● Gebruikelijke actieve en passieve mogelijkheden zijn beperkt (zelfs met hulp vermindert de patiënt zijn bewegingen)</li> <li>● Iedere beweging onmogelijk, verzet zich tegen elke poging tot mobilisatie</li> </ul>	0 1 2 3

**PSYCHOSOCIALE REACTIES:**

8. ● Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Onveranderd</li> <li>● Toegenomen (de patiënt trekt de aandacht op een ongebruikelijke manier)</li> <li>● Verminderd (de patiënt isoleert zich, zondert zich af)</li> <li>● Afwezigheid van of weigering van elke vorm van communicatie</li> </ul>	0 1 2 3
9. ● Sociale activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gebruikelijke deelname aan verschillende activiteiten (maaltijden, ontspanning, therapeutische activiteiten, etc.)</li> <li>● Deelname aan verschillende activiteiten alleen als men erom vraagt</li> <li>● Gedeeltelijke weigering om aan verschillende activiteiten deel te nemen</li> <li>● Alle sociale contacten worden geweigerd</li> </ul>	0 1 2 3
10. ● Gedragsproblemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normaal gedrag</li> <li>● Herhaalde gedragsproblemen bij toenadering</li> <li>● Permanente gedragsproblemen bij toenadering</li> <li>● Permanente gedragsproblemen (zonder aanleiding/ externe stimulus)</li> </ul>	0 1 2 3

SCORE